

Algorithme de l'écoulement urétral chez l'homme

Le Patient se plaint d'écoulement urétral ou de brûlures mictionnelles

Examiner, au besoin presser l'urètre

Présence d'un écoulement

non

Eduquer conseiller
Promouvoir et fournir
préservatifs
et promouvoir la double
protection
Proposer conseil dépistage
VIH

oui

Traiter pour Gonococcie (1) et chlamydie (2)
Eduquer et conseiller
Promouvoir et fournir préservatifs
et promouvoir la double protection
Proposer conseil dépistage VIH
Prise en charge des partenaires
Donner un rendez vous au 7ème jour

Persistance au 7ème jour ?

oui

Bonne observance et
respect des conseils

oui

Traiter Trichomonase
(3) et conseiller
Revoir au 7ème jour .

non

non

Eduquer et conseiller
Promouvoir et fournir
préservatifs et promouvoir
la double protection
Proposer conseil dépistage VIH

Reprendre
le traitement initial

Persistance au 7ème jour ?
Malgré Bonne observance

non

oui

Eduquer et conseiller
Promouvoir et fournir préservatifs
et promouvoir la double protection
Proposer conseil dépistage VIH

Référer

(1) Ciprofloxacine 250 mg : 2 cps en prise unique p.o ou Ceftriaxone 250 mg en une dose IM.

(2) **1er choix** Azithromycine 1g p.o en une prise.

2ème choix Doxycycline 100mg : 1 cp p.o 2 fois par jour pendant 7 jours

3ème Choix En cas d'allergie aux cyclines ou pour la prise en charge d'une partenaire enceinte ou allaitante: Erythromycine 500mg: 1 cp p.o 4 fois par jour pendant 7 jours.

(3) Métronidazole 500mg : 4 cps p.o en prise unique.